

El ecoturismo representa una opción de desarrollo integral y sostenible, una actividad que permite al poblador conocer sus riquezas naturales, preservar la biodiversidad y valorar todo lo que define su identidad cultural.



Caserío 7 de Junio,
Quebrada de
CASHIBOCOCHA,
UCAYALI



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
Leyenda del Resoluto N° 131-2016 SUJECU-CC



PROYECTO:

Estudio y promoción de la conservación de la Diversidad Biológica de bosque ribereño del Caserío 7 de Junio, en la Ribera de la Quebrada de Cashibococha, Distrito de Yarinacocha, Departamento de Ucayali - Perú.

Contrato de Adjudicación N° 129-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

ENA VILMA
Velazco Castro

LADY LAURA
Tuisima Coral

JHINMY KARC
Hemeryth Bartra

MELIZA
Huancas Valderrama

CRISTIAN
Shijap Chavez

Agradecimiento:

- AMAFOREST BIODIVERSITY
- Ing. IAFA. Fred Cristian Ramírez Guerra
- Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA)
Ing. Rodolfo Vásquez Martínez
- Ian Paul Simon Medina Torres

Informaciones:
evelazcoc@unia.edu.pe
961 554 273



Entrevista.



Promoción del ecoturismo.



Visita de turistas suecos.



Capacitación en regeneración natural de las especies de flora.



Monitoreo de aves.



Capacitación en reconocimiento de especies de flora en el bosque ribereño.

Además de realizar el registro y monitoreo de la flora y fauna existente, los especialistas capacitaron a los pobladores del caserío 7 de Junio sobre los recursos naturales existentes y el buen trato al turista.



Especies de flora



NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	USOS
<i>Albizia subdimidiata</i> (Splitg.) Bameby & J.W. Grimes	Pashaco	Fabaceae	Maderable, Jabón natural
<i>Alchornea discolor</i> Poepp.	Palometa huayo	Euphorbiaceae	Alimento para peces
<i>Calyculophyllum spruceanum</i> (Benth.) Hook. F. ex K. Schum.	Capirona	Rubiaceae	Maderable y Medicinal
<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn	Caimitillo	Sapotaceae	Maderable
<i>Cecropia</i> sp.	Cetico	Urticaceae	Alimento de fauna y Medicinal
<i>Coccoloba lehmannii</i> Lindau	Tangarana negro	Polygonaceae	Alimento para peces
<i>Cordia collococca</i> L.	Cordia	Boraginaceae	Medicinal
<i>Crateva tapia</i> L.	Tamara	Capparaceae	Madersable, alimento para fauna
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Ojé	Moraceae	Maderable, Medicinal (desparasitante)
<i>Genipa americana</i> L.	Huito	Rubiaceae	Maderable, Tinte natural, Medicinal, Alimento para fauna
<i>Hura crepitans</i> L.	Shimbillo	Fabaceae	Maderable, Alimento para fauna
<i>Laetia americana</i> L.	Timareo	Salicaceae	Maderable, Alimento para fauna, Alimento para peces
<i>Licania canescens</i> Benoist	Apacharama	Chrysobalanaceae	Maderable, Tinte natural
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.	Incira	Moraceae	Alimento para peces, Medicinal (usos en endodoncia)
<i>Monteverdia macrocarpa</i> (Ruiz & Pav.) Biral	Chuchuhuasi	Celastraceae	Medicinal
<i>Neea parviflora</i> Poepp. & Endl.	Palometa huayo	Nyctaginaceae	Alimento para peces
<i>Pterocarpus amazonum</i> Mart. ex Benth. Amshoff	Palosangre blanco	Fabaceae	Maderable
<i>Terminalia oxycarpa</i> Mart.	Yacushapana	Combretaceae	Maderable, tinte natural
<i>Triplaris weigeltiana</i> (Rchb.) Kuntze	Tangarana	Maderable	Maderable, tinte natural

Identificación realizada por Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA)

Confirmado por: Ing. Rodolfo Vásquez Martínez

Nota: 21 especies identificadas en el bosque ribereño se desconocen su utilidad y debe priorizarse su investigación.



Milvago chimachima



Nombre científico: *Milvago chimachima*

Familia: Falconidae

Nombre común: Shihuango blanco

Descripción: Presenta pico azul pálido, área periocular y cera amarillos, patas verdosas y ojos café rojizos. El adulto presenta cabeza, cuello y partes inferiores de color blanco crema con la coronilla sutilmente salpicada de marrón y línea postocular marrón oscuro. Su espalda y alas son de color café oscuro.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Tyrannus melancholicus

Nombre científico: *Tyrannus melancholicus*

Familia: Tyrannida

Nombre común: Tirano tropical

Descripción: Ave grande de vientre amarillo con cabeza gris, espalda verdosa y alas y cola marrones. Pico relativamente largo. El color de la cola es café pálido. Prefiere áreas abiertas con árboles y agua, pero también parques y vecindarios en las ciudades.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).





Furnarius *minor*

Nombre científico: *Furnarius minor*

Familia: Furnariidae

Nombre común: Hornero menor

Descripción: Ave pequeña de plumaje marrón rojizo, tiene las cejas, garganta blanca, corona gris y patas grises. Se encuentra en matorrales de islas fluviales y cerca de ríos principales.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Megaceryle *torquata*

Nombre científico: *Megaceryle torquata*

Familia: Cerylidae

Nombre común: Martín pescador grande

Descripción: Mide alrededor de 40 cm, los machos pesan entre 254 y 330 g y las hembras entre 274 y 325 g. El macho es de color azul grisáceo en las partes superiores, presenta garganta y amplio collar blancos, pecho y vientre rufo. En frente de los ojos tiene dos manchas semicirculares blancas. Sus plumas primarias son negras y las cobertoras infracaudales blancas con barras grises. Su pico es negro grisáceo con la base de la mandíbula inferior amarillenta. La hembra es similar al macho pero con una banda pectoral azul grisácea bordeada de blanco en su parte inferior.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Monasa *nigrifrons*

Nombre científico: *Monasa nigrifrons*

Familia: Bucconidae

Nombre común: Monjita de frente negra

Descripción: Ave de tamaño grande y de color negro, posee un pico rojo llamativo, iris oscuro, patas negras y una pequeña área desnuda y oscura detrás del ojo. Presenta plumaje negro lustroso, más negro alrededor del pico y con la parte posterior del cuerpo gris-azul. Su cola es de color negro-azul, presenta coberteras alares inferiores negro lustroso

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).

Nombre científico: *Gonatodes humeralis*

Familia: Sphaerodactylidae

Nombre común: Lagartija

Descripción: Se caracterizan por un acentuado dimorfismo sexual en coloración, con un grado variable de policromatismo en los machos. La mayoría de las especies del género son activas durante el día.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Gonatodes *humeralis*





Chloroceryle *talpacoti*

Nombre científico: *Chloroceryle amazona*

Familia: Alcedinidae

Nombre común: Martín pescador amazónico

Descripción: Los machos son principalmente verde bronceados por encima con collar y pequeñas manchas de color blanco enfrente de los ojos. Su garganta

y vientre son blancos y presenta rufo en el pecho con flancos estriados de verde oscuro. Su pico es negro y las patas gris oscuro. La hembra es similar al macho pero con banda pectoral verde incompleta. En esta especie las hembras son más pesadas que los machos.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Crotophaga *major*

Nombre científico: *Crotophaga major*

Familia: Cuculidae

Nombre común: Garrapatero grande

Descripción: Mide alrededor de 46 cm, los machos pesan en promedio 162 g y las hembras 145 g. Presenta ojos blancos, patas negras y pico negro comprimido lateralmente con culmen arqueado en la base de la mandíbula superior. El adulto es de color negro-azul lustroso con los bordes de las plumas de las alas verde bronceado y cola con lustre púrpura. Los jóvenes presentan iris café.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Ammodramus *aurifrons*

Nombre científico: *Ammodramus aurifrons*

Familia: Passerellidae

Nombre común: Gorrión de ceja amarilla

Descripción: Gorrión pequeño con un color pardo grisáceo estriado de oscuro en la cabeza, con amarillo notable en el rostro y frente. Se encuentra en las orillas de los ríos.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Cacicus *cela*

Nombre científico: *Cacicus cela*

Familia: Icteridae

Nombre común: Paucar

Descripción: Es un pájaro delgado, con los ojos de color azul. Su cuerpo es de color negro, con la cola, parte de su lomo y parte de las alas de color amarillo. Se alimenta de insectos, frutas y hojas. Característico por imitar el canto de otras aves y por sus nidos colgantes, fabricados con material vegetal y suspendidos de las ramas de los árboles.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Columbia talpacoti

Nombre científico: *Columbia talpacoti*

Familia: Columbidae

Nombre común: Torcasita

Descripción: Presenta iris café oscuro con anillo externo rojo. Su pico es café a negro y sus patas y dedos rosa. Presenta frente, coronilla y nuca gris. Su rostro y garganta son rosáceos y el resto del cuerpo castaño rosa con puntos negros en las alas. La hembra es más opaca y pálida que el macho.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Ardea alba

Nombre científico: *Ardea alba*

Familia: Ardeidae

Nombre común: Garza grande

Descripción: La garza blanca es un ave grande de plumaje blanco que puede alcanzar el metro de altura. Su longitud de pico a cola oscila entre los 80 y 104 cm. Machos y hembras son idénticos en apariencia, y los juveniles se parecen a los adultos en plumaje no reproductivo.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Anhima cornuta

Nombre científico: *Anhima cornuta*

Familia: Anhimidae

Nombre común: Camungo

Descripción: Es una hermosa ave de cuello largo, patas altas y alas provistas de dos robustos espolones en el carpo. Lleva en la cabeza un copete de consistencia córnea. Mide 60 cm de altura y dos metros de envergadura. Es de color negruzco, con reflejos verdosos, salvo la garganta que es gris, y el vientre, que es blanco.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Cathartes aura

Nombre científico: *Cathartes aura*

Nombre común: Galliinazo de cabeza roja

Descripción: Las plumas del cuerpo son en su mayoría de color marrón-negruzco. La superficie inferior de las plumas de vuelo de las alas es de color gris, creando contraste con los lineamientos alares más oscuros. La cabeza es pequeña en proporción al cuerpo y no tiene plumas; en los adultos es rojiza y en las especies juveniles es gris oscuro. Tiene un pico relativamente corto, ganchudo, de color marfil.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Ramphocellus carbo (hembra)

Nombre científico: *Ramphocellus carbo* (Hembra)

Familia: Thraupidae

Nombre común: Pico de plata

Descripción: El plumaje de la hembra es más opaco, con el dorso pardo rojizo, las partes inferiores de color marrón y el pico negro.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Ramphocellus carbo (macho)

Nombre científico: *Ramphocellus carbo* (macho)

Familia: Thraupidae

Nombre común: Pico de plata

Descripción: Los machos adultos son de plumaje color negro aterciopelado con garganta. La garganta y el pecho de color rojo carmesí profundo, que se destaca según la iluminación del sitio y se ve más intenso en las aves tomando el sol, cuando las plumas se apartan y algunas parecen erizadas.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Thlypopsis sórdida

Nombre científico: *Thlypopsis sordida* / **Familia:** Thraupidae / **Nombre común:** Tangara de cabeza naranja / **Descripción:** Ave inquieta con pico delgado y cabeza amarilla – anaranjado brillante, posee la espalda de color marrón oliva y la región ventral de color canela, mientras que la occipital es gris por encima y blanca por debajo. Las hembras son similares, pero más opacas.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Brotogeris cyanoptera

Nombre científico: *Brotogeris cyanoptera*

Familia: Psittacidae

Nombre común: Perico de ala de cobalto

Descripción: Esta ave mide de 18 a 20 cm y pesa cerca de 67 g. Tiene la cola corta y aguda. Su pico es amarillento opaco y tiene el cuerpo principalmente verde con la parte interior de la coronilla amarillenta y la barbilla naranja. Sus plumas primarias y cobertoras alares internas son azul cobalto y la superficie inferior de las rémiges verde azulosa.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).





Himantopus mexicanus

Nombre científico: *Himantopus mexicanus*

Familia: Recurvirostridae

Nombre común: Cigüeñuela de cuello negro

Descripción: Mide de 35 a 40 cm y pesa de 166 a 205 g. Presenta patas muy largas y pico largo, delgado y negro. El macho en estado reproductivo tiene las patas y el iris rojo brillante y su nuca, espalda, alas y parte posterior de la cabeza son de color negro. La hembra es similar al macho en estado reproductivo pero con tinte marrón en la espalda



y en escapulares, su plumaje no es tan brillante y no tiene tinte rosa en el pecho.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Fluvicola albiventer

Nombre científico: *Fluvicola albiventer*

Familia: Tyrannidae

Nombre común: Tirano de agua de dorso negro

Descripción: Esta ave mide alrededor de 12 cm de largo y pesa unos 12 g. Los adultos tienen de color blanco la frente, cara, todo lo ventral, un borde de la rabadilla y los filetes en cubiertas. El resto de lo dorsal, nuca, alas y cola son negras en el macho y parduscas en las hembras y jóvenes.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Sporophila castaneiventris

Nombre científico: *Sporophila castaneiventris*

Familia: Thraupidae

Nombre común: Espiguero de vientre castaño

Descripción: Mide cerca de 10 cm y pesa de 7 a 8 g. El macho tiene iris café oscuro, pico y patas negras. Presenta toda la cabeza incluyendo mejilla y coberteras auriculares de color gris azulado el cual se

extiende hasta la espalda y la rabadilla. Su cola es negruzca y sus alas también negruzcas con márgenes grisáceos. Presenta la barbilla y la garganta de color castaño el cual es más amplio en la parte alta del pecho y más estrecho en el vientre extendiéndose hasta las coberteras infracaudales.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Buteogallus urubitinga

Nombre científico: *Buteogallus urubitinga*

Familia: Accipitridae

Nombre común: Gavilán negro

Descripción: Mide 66cm de largo y pesa 1.1kg. Es de constitución fuerte. Las patas son largas, las alas anchas y la cola corta. Los adultos son negro opaco, plumas de la nuca con blanco en la base, patas amarillas largas, tibias negro uniforme, muslos y forro alar generalmente con barreteado blanco.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).





Forpus *xanthopterygius*

Nombre científico: *Forpus xanthopterygius*

Familia: Psittacidae

Nombre común: Periquito de ala azul

Descripción: Loro pequeño de cuerpo verde, larga cola puntiaguda y pico pálido. Los machos tienen parches azules en las alas y en la rabadilla mientras que las hembras son todas verdes. Altamente gregario. Encontrado en bordes de bosque, bosques poco densos, bosques secundarios, hábitats abiertos y parques urbanos, generalmente evita bosques espesos.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Stelgidopteryx *ruficollis*

Nombre científico: *Stelgidopteryx ruficollis*

Familia: Hirundinidae

Nombre común: Golondrina ala-rasposa sureña

Descripción: Mide 13 y pesa entre 14 y 18 g. Ambos sexos similares pero las plumas primarias de las hembras carecen de barbas recurvadas. El macho es principalmente café grisáceo tenuemente más oscuro en la coronilla que en la espalda y tenuemente más pálido en la rabadilla. Sus alas y cola son café negruzcas y las barbas de las plumas primarias externas son rígidas.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Paroaria *gularis*

Nombre científico: *Paroaria gularis*

Familia: Thraupidae

Nombre común: Cardenal de gorro rojo

Descripción: Mide alrededor de 16.5 cm y pesa de 20.8 a 32 g. Ambos sexos similares. Presenta pico largo con culmen decurvado, mandíbula superior negra e inferior amarillenta con punta negra. Tiene iris de color naranja rojizo y patas negruzcas. Su cabeza es roja con negro en el área loreal y postocular; su garganta hasta el alto pecho es negro y presenta una banda blanca en el pecho que se extiende por los lados hasta el cuello y la nuca.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Myiarchus *ferox*

Nombre científico: *Myiarchus ferox*

Familia: Tyrannidae

Nombre común: Copeton de cresta roja

Descripción: Mide alrededor de 18cm. Es ligeramente crestado y tiene pico negro. Por encima es de una tonalidad oliva pardusco con la cabeza más oscura. Sus alas y cola son color café oscuro (sin rufo en la cola). Tiene la garganta y el pecho gris pálido, bajas partes inferiores amarillo pálido y posee 2 barras alares difusas de un tono gris opaco. Los jóvenes tienen estrechos márgenes rufos en alas y cola.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).





Campephilus melanoleucos

Nombre científico: *Campephilus melanoleucos*

Familia: Picidae

Nombre común: Carpintero de cabeza roja

Descripción: Mide de 33 a 38 cm y pesa de 181 a 284 g. Presenta pico largo de color grisáceo a blanquizco con punta cincelada y culmen levemente curvo. Tiene iris blanco a amarillento pálido, piel ocular grisácea y patas gris a gris-verde. El macho presenta plumas de color ante blanquecino alrededor de la base del pico, una estrecha línea negra a través de la parte baja de la frente, una pequeña mancha ovada blanca y negra en la parte baja de las coberteras auriculares y el resto de la cabeza y cresta rojas. La hembra tiene cresta levemente más larga que el macho y el centro de la frente, la coronilla y la cresta de color negro. También presenta amplia región malar blanca con bordes negros.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Celeus flavus

Nombre científico: *Celeus flavus*

Familia: Picidae

Nombre común: Carpintero crema

Descripción: Mide de 24 a 26 cm y pesa de 95 a 131 g. Presenta pico amarillento con punta levemente cincelada y culmen decurvado. El iris de sus ojos es rojo a café rojo y sus patas de color gris oscuro a gris verde. Su cuerpo es principalmente de color amarillento pálido con cresta hirsuta y corta en occipucio. Presenta cola negra, coberteras alares de color café o café rufo con márgenes amarillos, plumas de vuelo también café y terciarias negras

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).



Myizetetes similis

Nombre científico: *Myizetetes similis*

Familia: Tyrannidae

Nombre común: Mosquero social

Descripción: Mide cerca de 16.5 cm y es de pico corto. Encima es de una tonalidad oliva, posee coberturas alares y rémiges internas con márgenes que van de blanco grisáceo a blanco anteado, el centro de la coronilla es gris pardusco (poco contrastante con espalda oliva) con un parche bermeillon semi oculto.

Categoría de amenaza: Preocupación menor (LC).

